

## Intossicazioni acute. Allarme dei pediatri: in Italia su 60mila casi, un terzo sono bambini. Farmaci responsabili nel 45% dei casi

LINK: [http://www.ilfarmacistaonline.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo\\_id=72428](http://www.ilfarmacistaonline.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=72428)



Intossicazioni acute. Allarme dei pediatri: in Italia su 60mila casi, un terzo sono bambini. Farmaci responsabili nel 45% dei casi. L'"avvelenamento" nell'88% dei casi avviene in ambito domestico, il 92% è accidentale. Nella prima infanzia la causa principale di intossicazione acuta è legata alla somministrazione non corretta di farmaci (sovradosaggio e l'interazione). Occhio anche ai prodotti per l'igiene domestica (26% delle intossicazioni acute). "Conservate i prodotti potenzialmente tossici, anche farmaci, fuori dalla portata dei bambini", mette in guardia la **Società Italiana di Medicina di Emergenza ed Urgenza Pediatrica**. 28 MAR - In Italia sono circa 60.000 i casi di intossicazioni acute registrati nell'ultimo anno, 19.500 dei quali bambini e adolescenti fino a 17 anni. Questi i dati allarmanti presentati in occasione del **Congresso** della **Società Italiana di Medicina di Emergenza ed Urgenza Pediatrica (Simeup)** - Sezione Umbria che da oggi al 30 marzo vedrà riuniti a Perugia imassimi esperti di pediatria con l'obiettivo di discutere di importanti aspetti legati alle patologie emergenti del bambino. "Nel nostro Paese - spiega la **Simeup** Umbria in una nota - le intossicazioni acute in età pediatrica rappresentano oltre il 40% dei casi di avvelenamento segnalati ai Centri Anti Veleno (CAV) e costituiscono il 3% dei ricoveri ospedalieri e il 7% dei ricoveri d'urgenza, con un tasso di mortalità che oscilla tra 0,1% e 0,3%". Principali responsabili del 45% delle intossicazioni acute sono i farmaci. A seguire prodotti per l'igiene domestica (26%), pesticidi (7%), alimenti (4,7%), prodotti industriali (3%), piante (2,3%). Nausea, vomito, tachicardia, cefalea e, nei casi più gravi, perdita di coscienza e convulsioni. Questi i principali sintomi delle intossicazioni acute che possono manifestarsi immediatamente dopo l'ingestione/inalazione oppure presentarsi anche dopo 12-48 ore. Nell'88% dei casi l'ambito domestico è il luogo principale in cui avviene l'intossicazione e il 92% si verifica in maniera accidentale. "Davanti a un sospetto di avvelenamento è indispensabile individuare la tipologia della sostanza tossica ingerita e consultare immediatamente il pediatra o recarsi tempestivamente in un Pronto Soccorso - commenta la Prof.ssa **Susanna Esposito**, Coordinatore Scientifico del **Congresso Simeup** Umbria e Professore Ordinario di Pediatria all'Università degli Studi di Perugia -. È altrettanto opportuno ricordare di non indurre il vomito in caso di ingestione schiumogena o caustica. Nel caso in cui vi fosse un contatto cutaneo è necessario rimuovere gli indumenti contaminati e lavare accuratamente la cute, senza strofinare con acqua corrente, mentre nel caso di contatto con gli occhi è opportuno un lavaggio prolungato a palpebre aperte con acqua a getto continuo. Si tratta di misure generali di primo soccorso pre-ospedaliero che possono rivelarsi importantissime. Fondamentale, poi, portare con sé il contenitore della sostanza responsabile e accertarsi della quantità ingerita e del tempo trascorso dall'assunzione." Nel lattante e nella prima infanzia la causa principale di intossicazione acuta è da attribuirsi alla non corretta somministrazione di farmaci: "il sovradosaggio e l'interazione

tra più principi attivi possono portare ad intossicazione", spiega la **Simeup** Umbria. "Il bambino acutamente intossicato, soprattutto nei primissimi anni di vita, può presentare un quadro clinico molto diverso rispetto all'adulto - evidenzia Franca Davanzo, Direttore S.C. Centro Antiveneni Dipartimento Emergenza Urgenza - E.A.S. Ospedale Niguarda di Milano -. Questo in rapporto all'imaturità anatomico-funzionale degli organi bersaglio. La conoscenza di tali specificità è essenziale per il pediatra e per l'infermiere chiamati al primo intervento e alla successiva assistenza del bambino intossicato, sul territorio o in Ospedale. Solo dopo i 5-6 anni di età, soprattutto per quanto riguarda le alterazioni dello stato di coscienza, la risposta clinica all'insulto tossico diventa simile a quella dell'adulto". La Simeup Umbria evidenzia come le intossicazioni acute in età pediatrica si registrino soprattutto in fasce orarie in cui i genitori sono impegnati nella preparazione dei pasti e conseguentemente meno attenti alla sorveglianza dei bambini. "Nella maggior parte dei casi, gli avvelenamenti accidentali potrebbero essere evitati seguendo delle precise regole", avverte la **Società Italiana di Medicina di Emergenza ed Urgenza Pediatrica**: - Conservare i prodotti potenzialmente tossici, anche farmaci, fuori dalla portata dei bambini - Non travasare questi prodotti in recipiente ad uso alimentare - Non mixare prodotti diversi per l'igiene domestica, ad esempio acidi con candeggina - Non somministrare farmaci senza prescrizione medica e attenersi scrupolosamente al foglietto illustrativo - Conservare i farmaci nella loro confezione originale e non lasciarli incustoditi - Non ingerire bacche o parti di piante- Non raccogliere funghi se non si è particolarmente esperti e tanto meno ingerirli - Verificare il corretto funzionamento degli impianti di riscaldamento per contrastare il rischio di intossicazione da monossido di carbonio 28 marzo 2019 ©