

## Punture di insetti e morsi di animali: ecco come agire

LINK: <https://www.ilfont.it/salute/punture-di-insetti-e-morsi-di-animali-ecco-come-agire-89240/>



Punture di insetti e morsi di animali: ecco come agire  
Giorgio Maggioni 45 minuti ago Salute Leave a comment 3 Views Share  
Punture di insetti e morsi di animali: che fare? Al mare come in montagna, nel Bel Paese come in Paesi esotici, in estate si tratta di inconvenienti sempre più frequenti. Bisogna prestare attenzione: se non sono curati correttamente, punture di insetti e morsi di animali possono rappresentare un rischio. Punture di insetti e morsi di animali: incontri indesiderati Dai ragni alle zecche, dalle zanzare alle pulci, dalle cimici agli imenotteri, passando per le meduse e le tracine, fino ad arrivare alle vipere: punture di insetti e morsi di animali sono quel che non vorremmo ci accadesse. L'Associazione mondiale per le Malattie infettive e i Disordini immunologici (WAidid) fornisce alcune raccomandazioni: permetteranno di affrontare incontri ravvicinati (non proprio desiderati) con

insetti e altri animali. Punture di insetti e morsi di animali: mantenere la calma Susanna Esposito, presidente dell'Associazione mondiale WAidid e professore ordinario di Pediatria all'Università degli Studi di Perugia, si è espressa in questo modo: 'Eruzioni cutanee, reazioni allergiche, e manifestazioni neurologiche come meningoencefaliti sono tutte gravi complicanze, che possono presentarsi in seguito a punture di insetti o morsi di animali. In ciascun caso, la prima cosa da fare è quella di mantenere la calma: l'agitazione, infatti, accelera il battito cardiaco, contribuendo a una dispersione più veloce del veleno dell'animale in questione. Se non si è correttamente informati, dunque, bisogna evitare manovre da 'manuale di sopravvivenza' e consultare il medico. È opportuno evidenziare, poi, come il medico debba essere immediatamente contattato nel caso in cui vi siano

manifestazioni respiratorie o calo pressorio. In questi casi, un intervento tempestivo può salvare la vita'. Punture di insetti e morsi di animali: le raccomandazioni WAidid Ecco le necessarie raccomandazioni, in caso di punture di insetti e morsi di animali. Ragni - Sebbene il 98-99% dei loro morsi sia innocuo, nei casi restanti il morso comporta ferite necrotiche, tossicità sistemica e, più di rado, la morte. Se la lesione non causa sintomi troppo intensi, al fine di limitare i disagi è possibile attuare semplici manovre di pronto soccorso (per esempio applicazione di ghiaccio, riposo e sollevamento dell'arto). Nel caso in cui si sviluppi una reazione più grave (allergia o tossicità sistemica), è consigliabile richiedere l'intervento medico immediato. In Italia, le specie il cui morso è di importanza medica per l'uomo sono principalmente tre: Il *Loxosceles rufescens*, comunemente chiamato 'ragno violino' per via di

una macchia scura presente sul dorso a forma di violino (Sardegna, Sicilia e isole minori) ; Lycosa tarentula, o tarantola, ragno ricoperto di peli neri e marroni (si trova nel centro e sud Italia); Latrodectus mactans, conosciuto anche come 'vedovanera'(soprattutto nel Nord America) . Zecche - La caratteristica della zecca è quella di inserirsi sottopelle. Per questo la prima cosa da fare è procedere con la sua rimozione attraverso una procedura ben precisa. È opportuno afferrare la zecca con una pinzetta dalle punte sottili. Il movimento volto a estrarre il parassita non dovrà essere deciso, bensì continuo e rotatorio. In alcuni casi, potrebbe rimanere comunque qualche traccia della zecca: essa andrebbe rimossa, in tempi brevi, mediante un ago sterile. Una volta eliminata, è opportuno disinfettare l'area interessata dal morso e tenerla sotto costante osservazione per un mese. La puntura di zecca può trasmettere all'uomo malattie molto pericolose. Un esempio ne sono la malattia di Lyme (diffusa in Friuli Venezia Giulia, Liguria, Veneto, Emilia Romagna, Trentino Alto Adige) e la meningoenfalite da zecche (diffusa in Veneto e,

in generale, nell'Europa settentrionale e centro orientale). Zanzara tigre - Nel nostro Paese Aedes albopictus (zanzara tigre, caratterizzata dal corpo nero a bande trasversali bianche sulle zampe e sull'addome), attiva al mattino presto e al tramonto da marzo fino all'inizio di dicembre, è vettore di malattie come la febbre di Chikungunya e la Dengue, che possono manifestarsi con sintomi simil-influenzali o con manifestazioni neurologiche. La terapia è esclusivamente sintomatica. Pulci - Le punture delle pulci degli animali domestici (per esempio gatti e cani) nell'uomo provocano delle piccole lesioni di tipo eritemato-pomfoide, che circondano il punto in cui la pulce ha morso l'ospite. Sembrano prediligere gli arti inferiori. Eventualmente, per ottenere sollievo, è possibile fare impacchi di ghiaccio sulle lesioni. Tuttavia, se i pomfi o le vescicole derivanti dalle punture delle pulci sono particolarmente fastidiose, possono essere utilizzati cortisonici per uso topico. In caso di reazioni allergiche sistemiche, si possono antistaminici per uso topico o sistemico. Fondamentale è la prevenzione con trattamenti antiparassitari negli animali

domestici e, in caso di infestazioni da pulci in casa, è opportuna una adeguata disinfestazione effettuata da aziende specializzate. Cimici da letto - Comuni negli alberghi, si annidano in punti nascosti tra materassi e cuscini, ma talvolta anche in divani e poltrone. Causano punture molto fastidiose, anche se in pochi giorni spariscono. Chi soffre di allergia alla saliva delle cimici, può sviluppare bolle e lesioni difficili da guarire. Per eliminarle definitivamente, si raccomanda di fare una lavatrice di vestiti e indumenti vari a 90°. Imenotteri - Nel caso di punture di api, vespe e calabroni, se ancora presente il pungiglione, è necessario provvedere alla sua rimozione entro 20 secondi, controllando che non rimangano residui. Impacchi di ghiaccio, da applicare per almeno 20 minuti, saranno utili per lenire il dolore e diminuire l'infiammazione. Lavare poi con acqua fredda. È utile anche identificare, se possibile, l'insetto responsabile. Nel caso in cui tali precauzioni non siano sufficienti, sarà necessaria la somministrazione di cortisonici per uso topico ed eventualmente antistaminici per via orale. Deve essere valutata la possibilità di reazioni allergiche. Se il paziente presenta orticaria

ed edema, potrà essere trattato soltanto con un ciclo orale di antistaminici e steroidi e dovrà essere tenuto sotto osservazione per almeno 4 ore. Se la situazione si presenta in modo più severo, ovvero con crisi respiratorie o dolori addominali, il farmaco di prima scelta è r a p p r e s e n t a t o dall'adrenalina. Vipera - Le vipere italiane hanno un morso che risulta fatale soltanto nello 0,1% dei casi e quasi sempre la mortalità dipende da complicazioni collaterali come reazioni allergiche, infarti o ictus e non dall'effetto diretto del veleno. Le vipere del Trentino e quelle dell'Appennino tosco-emiliano generalmente hanno un veleno più concentrato. La persona morsa deve evitare qualsiasi movimento p e r c h é q u e s t o velocizzerebbe la distribuzione del veleno nell'organismo. Per questo, la posizione ideale è quella supina. La porzione di cute interessata deve essere lavata con acqua e sapone, poi disinfettata con soluzioni prive di alcol, dal momento che questo aumenta la tossicità del veleno. Se il morso è localizzato nell'arto superiore, è consigliabile sfilare anelli e bracciali o orologi prima della comparsa del gonfiore.

Deve essere poi applicato un laccio a circa 5-6 centimetri a monte della ferita, per fermare la circolazione linfatica che veicola il veleno. Attenzione però a non stringere eccessivamente il laccio (deve poterci passare un dito) perché si corre il rischio di bloccare la circolazione sanguigna. Sulla zona del morso può essere applicato del ghiaccio. Si possono somministrare bevande eccitanti come tè o caffè, perché aiutano ad evitare un pericoloso calo pressorio. Indispensabile è il trasporto dell'infortunato al Pronto soccorso (muovendolo il meno possibile). Medusa -Le punture di medusa provocano bruciore e prurito intenso, mentre sulla pelle rimane una zona eritematosa ed edematosa, con possibile formazione di una bolla. Dopo una puntura di medusa, è necessario disinfettare con acqua di mare e poi con bicarbonato medicando, poi, la parte con un gel a base di cloruro d'alluminio. La stessa cura può risultare efficace anche in caso di contatto con le attinie o anemoni di mare. Non usare ammoniaca, limone, aceto, o alcol. Non strofinare o grattare perché si corre il rischio di mandare in circolo le tossine rilasciate. Non utilizzare

pinzette per rimuovere eventuali frammenti di tentacoli, perché la lacerazione di tessuti provocherebbe la fuoriuscita di tossine. Non disinfettare con acqua dolce, troppo fredda o ghiaccio. Tracina (o pesce ragno) - È tipica dei fondali sabbiosi da 2 a 50 metri di profondità. Può capitare che, passeggiando o giocando sul bagnasciuga, si poggia inavvertitamente una mano o un piede sui suoi aculei. Questi penetrano nellapelle e rilasciano una tossina: essa provoca un dolore immediato molto intenso, il punto di inoculazione del veleno si arrossa e si gonfia. Talvolta possono comparire formicolii, perdita di sensibilità nella parte interessata dalla puntura, nausea, vomito e febbre. Per alleviare il dolore bisogna sciacquare la parte colpita con acqua dolce. Procedere, eventualmente, con la rimozione degli aculei conficcati nella pelle. Poi, considerando che il calore distrugge il veleno e ne blocca la diffusione, è utile mettere il piede sotto la sabbia molto calda (o anche acqua calda): questo dona un'immediata sensazione di sollievo. Evitare assolutamente di applicare ghiaccio o ammoniaca. Il veleno della tracina non è considerato 'pericoloso' per l'uomo, anche se il dolore intenso può sfociare in

nausea, vomito e qualche  
linea di febbre, soprattutto  
nei più piccoli.