

WAIDID: SI A ESAMI SIEROLOGICI EA TAMPONI NASOFARINGEI IN CASO DI POSITIVITÀ

LINK: <https://www.imgpress.it/attualita/appello-di-waidid-si-ad-esami-sierologici-e-a-tamponi-nasofaringei-in-caso-di-positivita-per-evitare-gravi...>



Home Attualità **WAIDID: SI A ESAMI SIEROLOGICI E A TAMPONI NASOFARINGEI IN CASO DI POSITIVITÀ** Aprile 14, 2020 Attualità Tamponi da processare o con metodica tradizionale o con test rapidi per tutti i sintomatici, per tutti i contatti stretti di casi positivi e per chi richiede cure ospedaliere di qualsiasi tipo (parto, problemi medici acuti di qualsiasi genere, chirurgia d'elezione, terapie farmacologiche). Esami sierologici a chi è negativo al tampone ma è sintomatico (soprattutto se da più di 5 giorni), ai contatti stretti anche asintomatici dei casi positivi verificativi più di 7 giorni prima, agli operatori sanitari e ai lavoratori che devono riprendere le proprie attività. Gli esami diagnostici utilizzati in modo appropriato rappresentano l'unica strategia per interrompere la diffusione

del contagio e per prepararsi all'interruzione del lockdown. Secondo l'**Associazione Mondiale per le Malattie Infettive e i Disordini Immunologici (WAidid)** interrompere il lockdown è possibile solo se si prevede una strategia allargata e integrata di monitoraggio di Covid-19 attraverso l'impiego appropriato degli esami diagnostici a disposizione, ovvero dei test diagnostici anche rapidi per SARS-CoV-2 su tampone nasofaringeo e i prelievi del sangue per l'esame degli anticorpi contro SARS-CoV-2. Questi ultimi possono, infatti, aumentare in modo considerevole le nostre conoscenze sull'epidemiologia di COVID-19 e distinguere coloro che sono protetti da coloro ancora suscettibili all'infezione. "Seppur ancora in fase di validazione - spiega **Susanna Esposito**, Presidente **WAidid** e Professore Ordinario di Pediatria all'Università di Parma - sappiamo ormai

che gli esami sierologici eseguiti su sangue venoso e su sangue capillare hanno un ruolo importante nella strategia di monitoraggio e di contrasto alla diffusione di Covid-19. È vero che è necessario definire ulteriormente i test più sensibili e specifici ma, soprattutto negli ospedali, nelle residenze per anziani e nelle aziende che prevedono di riprendere a breve le proprie attività lavorative, oggi è sbagliato non impiegare gli esami sierologici standard o rapidi considerate le evidenze scientifiche raccolte nelle ultime settimane". **Waidid** raccomanda, quindi, l'impiego allargato degli esami diagnostici a disposizione, compreso l'utilizzo dei test sierologici, da eseguire soprattutto su alcune categorie di persone, in particolare chi è negativo al tampone ma ha sintomi suggestivi per infezione da SARS-CoV-2 (soprattutto se da più di 5 giorni), ai contatti stretti anche asintomatici dei casi positivi

verificativi più di 7 giorni prima, agli operatori sanitari e ai lavoratori che devono riprendere le proprie attività. "Si parla molto di interrompere il lockdown - continua **Susanna Esposito** - ma questo non sarà possibile se non attraverso adeguate indagini di sieroprevalenza per valutare la percentuale di soggetti con IgG contro SARS-CoV-2, così da evitare drammatici errori e ricadute in caso di una seconda ondata epidemica. Ormai sappiamo bene che un veicolo importante di trasmissione della malattia sono i portatori asintomatici, la cui identificazione deve essere effettuata all'interno di un percorso di monitoraggio integrato ma più aggressivo di quello che tuttora viene utilizzato in molte realtà del nostro Paese".