

## Influenza, l'Oms: "Il vaccino riduce di oltre il 50% il ricovero dei bambini"

LINK: [https://www.repubblica.it/salute/2020/10/07/news/influenza\\_l\\_oms\\_il\\_vaccino\\_riduce\\_di\\_oltre\\_il\\_50\\_il\\_ricovero\\_dei\\_bambini\\_-269774598/](https://www.repubblica.it/salute/2020/10/07/news/influenza_l_oms_il_vaccino_riduce_di_oltre_il_50_il_ricovero_dei_bambini_-269774598/)



Influenza, l'Oms: "Il vaccino riduce di oltre il 50% il ricovero dei bambini" (ansa) Anziani, donne in gravidanza e malati cronici di qualsiasi età sono le categorie più a rischio 07 Ottobre 2020 2° minuti di lettura "IN ITALIA l'influenza è tra le prime 10 cause di morte. In questa situazione di emergenza sanitaria, l'uso allargato del vaccino influenzale è da prevedere per tutti, indipendentemente dalla gratuità nelle singole Regioni. Ridurre il carico delle patologie influenzali e delle sovrainfezioni batteriche, che possono complicare l'influenza, significa soprattutto ridurre l'accesso al Pronto soccorso, le visite in ambulatorio e i ricoveri. Quanto ai ricoveri, sono proprio i lattanti e i bambini di età inferiore ai 2 anni a risultare tra coloro maggiormente a rischio, anche in assenza di patologie di base, motivo per cui alcune Regioni hanno esteso la

vaccinazione gratuita anche ai bambini sani di età compresa tra i 6 mesi e i 5 anni. La somministrazione del vaccino influenzale nei bambini, infatti, riduce di oltre il 50% la richiesta di ricovero per complicanze legate all'influenza". A sostenerlo **Susanna Esposito**, presidente **Associazione mondiale per le malattie infettive e i disordini immunologici (Waidid)**, professore ordinario di Pediatria all'Università di Parma ed esperta Oms nei Maternal, Neonatal, Child and Adolescent Health (Mncah) Research Network Working Groups (gruppo di esperti che ha l'obiettivo di definire l'approccio ai casi pediatrici gravi di infezione da SARS-CoV-2). 06 Ottobre 2020 Meno visite mediche Una riduzione del 90% di visite mediche per influenza nei più piccoli si registra in Gran Bretagna, dove la vaccinazione offerta gratuitamente a tutti i bambini e adolescenti sani ha raggiunto una copertura

vaccinale del 58,6% di soggetti tra 4 e 11 anni. Inoltre, a ridursi del 50% sono anche le visite mediche negli adulti, spesso contagiati dai più piccoli. Oltreoceano, poi, la vaccinazione dell'83% dei bambini canadesi di età inferiore ai 15 anni ha ridotto del 61% l'incidenza di influenza nei soggetti non vaccinati. Non solo bambini. Anziani, donne in gravidanza e malati cronici di qualsiasi età sono le categorie maggiormente a rischio di gravi complicanze influenzali come polmonite virale, polmonite batterica secondaria e peggioramento delle condizioni mediche sottostanti. Per i bambini al di sotto dei 9 anni di età, mai vaccinati in precedenza, si raccomandano due dosi di vaccino antinfluenzale, da somministrare a distanza di almeno quattro settimane. Una sola dose di vaccino antinfluenzale, invece, è sufficiente per i soggetti di tutte le età superiori a questa fascia e anche per i

bambini più piccoli se già  
vaccinati in precedenza.

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato